LE LABO
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

Le patient doit porter un masque, s'il n'en a pas, lui en fournir un

- **Habillage spécifique du préleveur avec :**
  - Un masque FFP2
  - Une blouse
  - Une surblouse
  - Une charlotte
  - Des lunettes de protection ou une visière
  - Des gants à usage unique

- **Remplir la fiche de renseignements cliniques COVID-19**

- **Prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage :**

1. **Matériel :**
   - un tube collecteur adapté + 1 écouvillon fin
   - une pochette plastique (si prélèvement fait à l'extérieur du Laboratoire)

2. **<u>Mode opératoire</u> :**
   - Faire asseoir le patient, la tête en appui sur le dossier ou le mur
   - Se positionner devant le patient mais sur le coté (pas en face)
   - Soulever la pointe du nez et introduire l'écouvillon dans la narine parallèlement au palais en longeant le plancher de la fosse nasale jusqu'au contact de la paroi naso-pharyngée (= prélèvement profond)
   - Imprimer un léger mouvement de rotation de l'écouvillon
   - Retirer l'écouvillon délicatement
   - Si un prélèvement n'a pas pu être réalisés sur la 1ere narine, procéder de la même manière pour l'autre narine avec le même écouvillon
   - Décharger l'écouvillon dans le tube
   - Jeter l'écouvillon en container DASRI
   - **Bien reboucher** le tube
   - **Identifier** le tube

En cas de prélèvement fait à l'extérieur du Laboratoire :
- ✓ Mettre le tube et la fiche de renseignements cliniques dans la pochette
- ✓ Refermer la pochette

Acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire.
Le conserver à +4°C si aucun coursier ne passe avant le lendemain.



Désinfecter la salle de prélèvement entre chaque patient
avec papier à usage unique et spray type Primatyl®

V7 – 15/12/2021

SELARL Le Labo Parc Monceau – Siège social 20 rue Alfred de Vigny - 75017 PARIS
Tel 01 42 27 00 35 – Fax 01 42 27 02 77