LE LABO
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

Objet	Cette instruction décrit la gestion d'un malaise patient
Malaise sans perte de connaissance	Arrêter immédiatement le prélèvement Rassurer le patient, lui parler. Comprimer le point de prélèvement (demander au patient de le faire s'il est en mesure d'écouter sinon utiliser un garrot peu serré pour maintenir le pansement en pression). Incliner totalement le dossier du fauteuil afin que le patient soit le plus allongé possible Desserrer éventuellement col, cravate, ceinture Si cela ne suffit pas, relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête. Eviter la perte de connaissance en retenant l'attention du patient, lui placer quelques feuilles de papier essuie-main imprégnée d'eau fraiche sur la nuque et sur le front, le faire respirer calmement. Lui proposer un verre d'eau, du sucre. Vérifier l'amélioration de l'état du patient et mettre en place un pansement. Le faire relever par étapes : assis puis debout
Malaise avec perte de connaissance	Arrêter immédiatement le prélèvement. Faire prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de l'AFGSU sans laisser le patient seul. Incliner totalement le dossier du fauteuil afin que le patient soit le plus allongé possible Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si besoin. Si le malaise se prolonge (5-10 min), ou si l'état du patient s'aggrave (difficulté pour respirer, problème cardiaque, convulsion…) appeler le 18. Après reprise de connaissance, si le patient ne semble pas en état de rentrer chez lui seul, essayer de joindre un proche du patient pour le raccompagner,
Traçabilité	Signaler l'incident en Post it PATIENT Ajouter un code analyse PRLVT dans son dossier « malaise patient lors du prélèvement »